



DEVITALIZZAZIONE: COSA FARE DOPO UNA TERAPIA CANALARE

Caro paziente, dopo l'intervento di devitalizzazione, non necessariamente si sviluppa dolore, ma se questo dovesse insorgere, si presenterà da sei a dodici ore dopo l'intervento, o anche differito di un giorno o due, quando ormai l'esperienza di devitalizzazione cominciava ad essere un ricordo.

Di solito, quando il dolore compare, non è mai tragico e comunque sempre dominabile dai comuni antidolorifici (Aulin, Mesulid, Oki, Toradol, Sinflex, Moment, Efferalgan, Voltaren, generico antidolorifico ecc.).

L'Aspirina è leggermente meno efficace.

Il paracetemolo (Tachipirina) è poco efficace, ma utile nei casi di intolleranza ad altri antidolorifici.

La durata e l'intensità del dolore è estremamente varia: può essere insignificante o estremamente fastidioso, ma di solito non dura più di 6-7 giorni.

Se il dolore persiste sino al giorno dell'appuntamento successivo, che viene dato appositamente dopo sette giorni dall'intervento precedente, potrà rendersi necessario spostare ulteriormente l'incontro con il dentista.

Alcune volte, associato al dolore, può presentarsi un gonfiore inatteso.

Questa eventualità non deve preoccupare, perchè per quanto poco frequente, questa è una evenienza normale, successiva alle medicazioni con jodoformica o idrossido di calcio. In questo caso, tuttavia, è buona norma una copertura antibiotica con:

Zimox 1 gr (oppure generico: amoxicillina 1 gr): una compressa, 2 volte al giorno (una ogni dodici ore) per sei giorni, **se non allergico alla penicillina altrimenti:**

Eritromicina 1 gr: una compressa ogni 12 ore per sei giorni
oppure:

Rovamicina 3.000.000 U.I. Una compressa ogni otto ore per sei giorni.

Le ricordo per ogni evenienza, il numero di telefono dove potrà sempre rintracciarmi:

Milano 02.6552123

Trezzano 02.4456933